

کربنات کلسیم:

به عنوان پایین آورده فسفر یا کمک به افزایش کلسیم مصرف می شود.

مراقبت و توجهات:

این دارو اگر به علت اصلاح کلسیم باشد، یک ساعت بعد از غذا میل می شود و اگر با هدف اصلاح فسفر باشد در وسط غذا میل می شود.

شناسایی غذاهای با فسفر زیاد و محدودیت مصرف آن ها

در دمای 15-30 درجه در پوشش بسته بندی نگه داری شود.

در صورت بروز عوارض به پزشک خود اطلاع دهید.

روکاترول یا کلسی تریول:

در درمان کاهش کلسیم خون کاربرد دارد. این دارو جذب کلسیم روده را افزایش می دهد.

شکل دارو:

به صورت کپسول های 0/25 میکروگرمی است.

عوارض:

سردرد، بی خوابی، ضعف، تهوع، یبوست، طعم فلز در دهان، بی اشتها



داروهای مصرفی در بیماران دیالیزی



سال 1402

دفتر آموزش پرستاری و مامایی

مراقبت و توجهات:

1. دارو را می توان همراه با غذا یا معده خالی مصرف نمود
2. دارو را با ظرف مقاوم به نور و در محل خشک و دمای 15 تا 30 درجه نگه داری نمایید.
3. در صورت بروز علائم ذکر شده به پزشک خود اطلاع دهید.
4. از شکستن، خورد کردن و جویدن کپسول خودداری کنید.
5. دارو را همزمان با داروهایی مثل سایمتیدین، رانیتیدین و کلسترامین و داروهای ضد تشنج مثل فنی تویین مصرف نکنید این داروها اثرات روکاتورول را کاهش می دهند.
6. افرادی که دچار افزایش سطح کلسیم خون هستند نباید از این دارو استفاده کنند.

رناژل(سولامر):

به پایین آوردن فسفر کمک می نماید. رناژل همچنین با اسید های صفراوی باند شده و بدین ترتیب سطح کلسترول خون را پایین می آورد.

شکل دارو:

به شکل قرص های سفید رنگ بیضوی و روکش دار 400 و 800 میلی گرمی می باشد.

عوارض:

سر درد، تهوع، استفراغ، اسهال و کاهش فشار خون

مراقبت و توجهات:

1. رعایت رژیم غذایی کم فسفر
2. دارو با داروهای ضد تشنج، ضد آریتمی، وارفارین و سیپروفلوکساسین تداخل دارد. فاصله مصرف آنها حداقل باید 1 تا 3 ساعت باشد.
3. رناژل باید همراه غذا مصرف شود.
4. در صورت فراموشی، نوبت فراموش شده حذف شود و نوبت بعدی خود همراه غذا مصرف شود و از دو برابر کردن دارو خودداری شود.
5. دارو در دمای 25 درجه نگه داری شود

منبع: مبانی همودیالیز برای پرستاران_ جودیت زد. کالنباخ

آدرس لینک آموزشی بیمارستان:

<http://alios.zau.ac.ir/38109.page>