

از آنجایی که مصرف صحیح داروها در بیماران دیالیزی جزئی از درمان محسوب می شود و اهمیت بسزایی در سلامت شما دارد لذا نکاتی چند در مورد داروها که توجه به آنها بسیار مهم است را یادآور میشویم.

اریتروپویتین (اِپرکس):

پروتئینی است که در کلیه ها برای تحریک مغز استخوان جهت ساختن گلبول های قرمز تولید می شود و با افزایش اریتروپویتین بدن با اپرکس، کم خونی اصلاح شده و به شما برای داشتن انرژی بیشتر و خستگی کمتر کمک میکند.

شکل دارو:

آمپول های 2000 واحدی، 4000 واحدی و 10000 واحدی

روش استفاده:

وریدی و زیر جلدی که به صورت زیر جلدی اثر بیشتری دارد

عوارض جانبی:

افزایش فشار خون، استعداد بروز لخته

مراقبت و توجهات:

1. کنترل فشار خون و دقت در مصرف داروهای ضد فشار خون

2. رعایت رژیم غذایی کم پتاسیم



داروهای مصرفی در بیماران دیالیزی



ناظر علمی: دکتر شهرکی

سال 1400

دفتر آموزش پرستاری و مامایی

نحوه نگهداری صحیح دارو:

1. از تکان دادن شدید آمپول یا شیشه دارو هنگامی که دارو در جعبه قرار دارد خودداری نمایید.
 2. سریعاً اپرکس را به یخچال با دمای بین 2 تا 8 درجه سانتی گراد منتقل کنید.
 3. از مجاورت نور و منابع گرمایی دور نگه دارید.
 4. از گرم کردن اپرکس با استفاده از مالش شدید در میان کف دست خودداری نمایید.
 5. نیم ساعت قبل از مصرف در دمای اتاق باشد.
 6. جهت انتقال دارو به منزل یا بیمارستان از جعبه یا کیف مخصوص همراه با یخ استفاده نمایید.
- در صورت مشاهده یکی از موارد زیر دارو را استفاده نکنید:

1. کندورت یا رنگی شدن دارو

2. مشاهده ذرات معلق یا کف

3. خاموش شدن یخچال بر اثر دمای زیر صفر یا گرم شدن در دمای بیش از 25 درجه

4. گذشتن تاریخ انقضا

ونوفر(آهن):

از ترکیبات آهن ساکروز می باشد که به درمان کم خونی کمک میکند.

شکل دارو:

به صورت آمپول 100 میلی گرمی

عوارض:

افت فشار خون، سرگیجه، سردی، تهوع و استفراغ، درد مفاصل، درد عضلانی، درد سینه، احساس طعم فلزی در دهان

مراقبت و توجهات:

1. در صورت بروز عوارض حتماً اطلاع داده شود.
2. نیاز به نگه داری در یخچال ندارد.
3. حتماً در مراکز درمانی تزریق شود.
4. در زمان تجویز قرص آهن قطع شود.

منبع: کتاب پرستار و دیالیز

آدرس لینک آموزشی بیمارستان:

<http://alihos.zaums.ac.ir/page38109>