

نحوه تزریق سوزن فیستولا:

پرستار باید قبل از هر تزریق دست ها را شسته دستکش بپوشد

به بیمار آموزش دهیم قبل از هر تزریق عضو فیستول دار را با آب و صابون بشوید



جهت سوزن فیستولا:


سوزن وریدی باید به سمت قلب وارد شود و محل ورود سوزن شریانی حداقل پنج سانتی متر پایین تر و خلاف جهت قلب باشد

استراتژی های قرار دادن سوزن و طریقه و شیوه قرار دادن آن در عملکرد و بقای دسترسي عروقي خصوصا فیستول شریانی و وریدی بسیار نقش دارد


طریقه نردبانی یا چرخشی :

استفاده از طول و کل دسترسي عروقي را در جلسات مختلف دیالیز فراهم می آورد و محدود به دو نقطه مشخص نخواهد شد

هموستاز با اعمال فشار مستقیم پس از خروج سوزن به دست می آید



کانولاسیون شریانی-وریدی




ناظر علمی: دکتر علیدادی

دفتر آموزش پرستاری و مامایی

سال ۱۴۰۲

نحوه ضد عفونی کردن محل تزریق:



منبع: کتاب پرستار و دیالیز

شماره تلفن بیمارستان: 05433295575-90

شماره داخلی: 1565-1566

آدرس لینک آموزشی بیمارستان:

<http://alihos.zaums.ac.ir/38109.page>

4. قبل از تزریق سوزن محل را با محلول الکلی به صورت دورانی تمیز و ضد عفونی کنید

5. پس از ضد عفونی دقیقه ای صبر کنید تا الکل خشک شود

6. فراموش نکنید داخل کردن سوزن فیستولا از طرف بریدگی صدمه کمتری به لایه های عروقی وارد میکند



1. فیستول را از نظر کارکرد

ارزیابی کنید

2. دقت کنید حداقل با فاصله سه

انگشت با محل فیستول سوزن

شریان را قرار دهید

3. از تزریق مکرر سوزن به یک

نقطه پرهیزید و مرتباً محل

تزریق سوزن ها را تغییر دهید

