

عوارض احتمالی برونکوسکوپي :

- خونريزي از محل نمونه برداري
- جمع شدن هوا اطراف ريه ها
- کاهش اكسيژن خون
- سوراخ شدگي ريه
- ايست تنفسي



- احتمال گرفتگی صدا، زخم گلو و یا وجود رگه های خون در آب دهان می تواند بعد از برونکوسکوپي به صورت کم و موقت وجود دارد.
- بهتر است برای شروع خواندن، از مایعات استفاده کنید.
- در بیمارانی که به صورت سرپایی مراجعه می کنند نمونه توسط همراه بیمار به آزمایشگاه و پاتولوژی برده می شود.

در صورت بروز یکی از
نشانه های زیر بعد از
انجام برونکوسکوپي به
پزشک اطلاع دهید :

- بی قراری
- تنگی نفس
- عدم آگاهی
- نا منظم شدن ضربان قلب
- سیاه شدن لبها و سر انگشتان
- خونريزي
- کاهش فشار خون




کد سند : AE/AB/HES/BR-RES/03/01

تاریخ تدوین: 400/1/20 شماره بازنگری: 1

تاریخ بازنگری: 1402/1/20

تاریخ: 1404/1/20

برونکوسکوپي



ناظر علمی: دکتر مولایی

دفتر آموزش سلامت

تأبستان 1402

تعریف برونکوسکوپي

برونکوسکوپي اقدام تشخیصی و گاهی درمانی است.

لوله دستگاه برونکوسکوپ از بینی یا دهان وارد راه های هوایی شده و از طریق آن پزشک قادر به مشاهده مستقیم داخل مجاری هوایی می باشد. برونکوسکوپي هنگامی انجام می شود که پزشک بر اساس شرح حال، معاینه، عکس قفسه سینه و سی تی اسکن قادر به تشخیص قطعی بیماری ریوی نباشد.

موارد زیر را قبل از انجام برونکوسکوپي رعایت کنید.

- قبل از انجام برونکوسکوپي بیمار یا کسی که کفالت او را به عهده دارد باید برگه رضایت نامه را با دقت مطالعه و سپس امضا کند.
- داشتن یک همراهی الزامیست.
- لاک های ناخن خود را پاک کنید.
- شب قبل از برونکوسکوپي آقایان بهتر است صورت خود را اصلاح کنند.

- از 8 ساعت قبل از برونکوسکوپي باید ناشتا باشد.
- در صورت داشتن دندان مصنوعی، لنزهای چشمی و زیورآلات آنها را خارج کنید.
- در صورتی که داروی خاصی مصرف می کنید مانند داروهای ضد انعقاد، داروهای قلب، ضد فشار خون بالا، آسپرین و داروی کاهش دهنده قند خون و ... به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید.

نکته:

در صورت داشتن هر گونه حساسیت دارویی به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید.

منبع: برونر و سودارت - بخش تنفس 2020

شماره تلفن بیمارستان: 054-33295573

شماره داخلی: 1230 آدرس لینک آموزش به بیمار بیمارستان:

*آموزش-به-بیمار-و-ارتقای-

سلامت/https://alihos.zaums.ac.ir

موارد زیر را در حین انجام برونکوسکوپي برای شما انجام می شود:

از داروی بی حسی موضعی در دهان شما به صورت اسپری استفاده می شود و در صورت نیاز اکسیژن از طریق سوند بینی برای شما گذاشته می شود.

از دستگاهی جهت اندازه گیری میزان اکسیژن خون استفاده می شود که به صورت گیره به نوک انگشت متصل می شود.

موارد زیر را بعد از انجام برونکوسکوپي رعایت کنید:

- بیماران سرپایی به مدت نیم ساعت در بخش برونکوسکوپي تحت نظر می باشند.
- تا وقتی که سنگینی و بی حسی حلق و دهان از بین نرفته چیزی نخورده شود که معمولاً 2 تا 2/5 ساعت بعد از برونکوسکوپي می باشد.