


آمادگی قبل از بیهوشی:

استحمام کنید، لاک نزنید، آرایش نکنید، از شب قبل عمل (8-10 ساعت) هیچ مواد غذایی میل نکنید، در صورت داشتن دندان مصنوعی و یا دندان لق اطلاع داده و در صورت امکان دندان مصنوعی را خارج کنید.



تعریف لوله گذاری داخل تراشه:

جایگذاری یک لوله پلاستیکی انعطاف پذیر به داخل تراشه جهت فراهم نمودن یک راه هوایی مناسب و اطمینان از اکسیژن رسانی زمانی که شما بیهوش هستید.

انواع روش های لوله گذاری داخل نای:

لوله گذاری از طریق بینی



لوله گذاری از طریق دهان



کد سند : AE/AB/HES/BR-RES/09/01

تاریخ تدوین: 1400/1/20 شماره بازنگری: 1

تاریخ بازنگری: 1402/1/20

لوله گذاری
داخل تراشه



ناظر علمی: دکتر آزادی

دفتر آموزش سلامت

تأبستان 1402

عوارض لوله گذاری داخل تراشه:

- لوله ممکن است باعث ایجاد ناراحتی در شما شود
- به علت تحریک ته حلق دچار تهوع و استفراغ شوید
- به علت بسته شدن گلوت رفلکس سرفه شما کاهش میابد
- و احتمال ایجاد عفونت را در بدن شما افزایش دهد
- مهمترین مشکل شما عدم توانایی در صحبت کردن است
- و بعد خروج لوله گرفتگی صدا به صورت موقت اتفاق بیفتد
- به علت وجود لوله در دراز مدت ممکن است زخم گوشه لب شما و یا تنگی حنجره ایجاد شود.

بعدعمل 8 تا 10 ساعت جهت خارج کردن لوله تراشه زمان میبرد ممکن است شما هوشیار باشید و به علت وجود لوله داخل دهان دچار ترس و اضطراب شوید زیرا شما قادر به صحبت کردن و ارتباط کلامی نیستید.



منبع: برونر وسودارث -بخش تنفس 2020
شماره تلفن بیمارستان: 054-33295573
شماره داخلی: 1083 آدرس لینک آموزش به بیمار بیمارستان:
*آموزش-به-بیمار-و-ارتقای-
سلامت/ <https://alijos.zaums.ac.ir/>

مراقبت های بعد از عمل:

تا هوشیاری کامل، شما همچنان به دستگاه تنفسی وصل هستید.

با توجه به دستور پزشک براساس شرایط بهبودی شما ثابت بودن فشار خون و داشتن تنفس خود به خودی، اقدام به خارج سازی لوله می شود.

در مدت وجود لوله داخل دهان شما، جهت اطمینان از باز بودن راه هوایی و جلوگیری از مسدود شدن راه هوایی ترشحات داخل لوله تراشه را با ساکشن تمیز میکنیم.

