

تعویض خون نوزاد جهت کاهش مقدار بیلی روبین خون و پیشگیری و درمان عوارض ناشی از افزایش بیلی روبین انجام می شود.

بیلی روبین ماده ای است که سبب زرد شدن پوست گردیده و مقدار بیش از حد آن سبب عوارض جدی و غیر قابل جبران از جمله معلولیت و مرگ می شود.

چنانچه میزان زردی خیلی بالا باشد و نوردرمانی نتواند در مدت معین زردی نوزاد را کاهش دهد تعویض خون نوزاد روشی مناسب در درمان زردی است.



کد سند : AE/AB/HES/BR-INFA/02/01 تاریخ تدوین: 1400/1/20
شماره بازنگری: 1 تاریخ بازنگری: 1402/1/20 تاریخ بازنگری

تعویض خون



ناظر علمی: آقای دکتر عباسی
تابستان 1402
دفتر آموزش سلامت

➤ MRI مغزی طبق صلاحدید پزشک

منبع: کتاب مراقبتهای بحرانی نوزاد در معرض
خطر

آدرس لینک آموزش به بیمار بیمارستان:

*آموزش-به-بیمار-و-ارتقای-سلامت/<https://alihos.zaums.ac.ir>

برای اینکار لوله نازک و بسیار انعطاف پذیری در
رگ ناف نوزاد گذاشته می شود و تعویض خون
نوزاد با خون اهدایی از بانک خون انجام می
گردد.

اقداماتی که پس از ترخیص نوزاد
باید انجام شوند

➤ انجام شنوایی سنجی در یکماهگی

➤ 24 تا 48 ساعت بعد از ترخیص مراجعه به

پزشک جهت کنترل از نظر عود زردی

➤ ارزیابی دراز مدت از نظر بروز عوارض

عصبی - تکاملی و سایر عوارض