

## موارد منع مصرف

- در افراد دچار حساسیت شدید به سفالوسپورینها و پنی سیلین و در بیماری پورفیری { نوعی بیماری خونی } نباید مصرف شود

## تداخلات دارویی

- در صورت مصرف همزمان با آمینوگلیکوزیدها مثل جنتامایسین وونکومایسین احتمال آسیب کلیوی افزایش میابد .
- اثرات ضد انعقادی وارفارین ممکن است در صورت مصرف همزمان با این دارو افزایش یابد .

## نکته

- صرف در کودکان و زنان باردار بی خطر میباشد ولی در شیردهی باید با احتیاط مصرف شود چرا که ممکن است باعث بروز اسهال - عفونت قارچی دهان یا واکنش آلرژیک در شیرخوار شود.

شماره تلفن بیمارستان: ۰۵۴۳۲۹۵۵۷۰-۸۰

شماره داخلی: ۱۶۷۳

آدرس لینک آموزش به بیمار بیمارستان:

\*آموزش-به-بیمار-و-ارتقای-

سلامت/https://alihos.zaums.ac.ir

سفتاژیدیم از سفالوسپورینهای نسل سوم میباشد که علیه باکتریهای گرم منفی خصوصا پسودوموناس موثر است . سفتازیدیم میتواند از csf عبور کند و در درمان منزشت بکار برود . همچنین در پیشگیری از بروز عفونت پس از عمل جراحی مصرف میشود

## مکانیسم اثر

این دارو از طریق مهار سنتز دیواره سلول باکتری موجب ناپایداری باکتری میشود و آثار باکتریسیدی دارد .

## فارموکینیتیک

اوچ غلظت سرمی دارو یک ساعت بعد از تزریق عضلانی بدست می آید و نیمه عمر دارو در خون حدود دو ساعت میباشد که در صورت معیوب بوئن کلیه افزایش میابد

## عوارض جانبی

اسهال - تهوع - اسفراغ - احساس ناراحتی در شکم - سردرد - واکنش آلرژیک - اختلال در آنزیمهای کبد - اریتم مولتی فرم



کد سند: AE/AB/HES/BR-PED/23/01

تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۶/۲۰ شماره بازنگری:

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۶/۲۰ تاریخ بازنگری بعدی:

## سفتاژیدیم



ناظر علمی: دکتر محمد عارف امامی

(استاد و متخصص جراحی کودکان و اورولوژی)

دفتر آموزش سلامت

تابستان ۱۴۰۲