



کد سند : AE/AB/HES/BR-NEU/11/01 تاریخ تدوین: ۱۴۰۰/۱/۲۰
شماره بازنگری: 1 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۱/۲۰ تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۴/۱/۲۰

مراقبتها و احتیاطات در حین مصرف لووبل



ناظر علمی: دکتر علیرضا خسروی
(استاد و متخصص بیماری های مغز و اعصاب)

تابستان ۱۴۰۲
دفتر آموزش سلامت

لووتیراستام برای کمک به کنترل انواع خاصی از تشنج در درمان

صرع استفاده می شود. این دارو صرع را درمان نمی کند و تشنج تا زمانی که شما همچنان به استفاده از آن ادامه می دهید کنترل می شود.

لووتیراستام ممکن است با غذا یا بدون غذا یا با معده پر یا خالی مصرف شود.

عوارض دارو:

۱. رفتار خشونت آمیز یا عصبانی
۲. اضطراب
۳. تغییر در شخصیت
۴. از دست دادن اشتها
۵. خستگی یا ضعف غیر معمول
۶. از دست دادن اشتها
۷. احساس عمومی ناراحتی و یا بیماری
۸. مشکل در تمرکز

توصیه های جدی پزشکان:

تجویز دارو در بیماران با نارسایی کبدی شدید و نیز در بیماران با نارسایی کلیوی و یا تحت دیالیز باید با احتیاط و تعدیل دوز صورت گیرد.

در حین درمان با لوتیراستام عملکرد کلیه، سی بی سی، مقدار هموگلوبین و مقدار مصرف و دفع مایعات باید بررسی شود.

در طول درمان با داروی لوتیراستام وضعیت ذهنی بیمار را مورد توجه قرار دهید.

در طول درمان با داروی لوتیراستام حملات تشنجی را مورد بررسی قرار دهید (مدت، شدت، نوع حمله، عوامل تشدید کننده، عوامل تسکین دهنده).

منبع:

پرستاری بیماری های مغز و اعصاب-برونر و سوارث

آدرس لینک آموزش به بیمار بیمارستان:

*آموزش-به-بیمار-و-ارتقای-

<https://alihos.zaums.ac.ir/سلامت>