



کد سند : AE/AB/HES/BR-HEA/17/01

تاریخ تدوین: 1400/1/20 شماره بازنگری: 1

تاریخ بازنگری: 1402/1/20 تاریخ بازنگری بعدی: 1404/1/20

مراقبت های قبل از آنژیوگرافی



ناظر علمی: دکتر یزدانی

دفتر آموزش سلامت

سال 1402

مراقبت های قبل از آنژیوگرافی:

از شب قبل چیزی میل نکنید. درمورد خوردن داروها صبح روز آنژیوگرافی سوال کنید.

بهتر است آسپرین را به میزان کافی و طبق دستور مصرف کنید تا اگر نیازمند تعبیه ی استنت بودید ، خون شما به اندازه ی کافی رقیق شده باشد.

پلاویکس داروی مهمی است که در بیمارانی که در بیماران نیازمند تعبیه ی استنت استفاده میشود. این دارو هم خون را رقیق می کند . البته بهتر است طبق دستور پزشک مصرف شود زیرا فقط بیماری که احتمال گرفتگی عروق در او بیشتر است و نیازمند تعبیه ی استنت است و خونش باید به اندازه ی کافی رقیق شده باشد.

قبل از مراجعه به اتاق آنژیوگرافی پزشک از شما شرح حال خواهد گرفت. آنژیوگرافی نیاز به بیهوشی ندارد و با بی حسی موضعی انجام می شود. اما برای کاهش استرس در طول تست آرامبخش نیز تجویز خواهد شد.

هنگام تزریق ماده حاجب ممکن است احساس داغی ، گرگرفتگی یا فشار و سوزش در قفسه سینه داشته باشید که نگران کننده نیست و چند ثانیه بعد از بین می رود.

نبض یا نبض پشت زانو قبل و بعد از آنژیوگرافی توسط پرستار کنترل می شود.

در صورت داشتن استرس و اضطراب دارو بصورت تزریقی یا خوراکی تجویز می شود.

مراقبت بعد از آنژیوگرافی:

هنگامی که عمل به پایان می رسد ، لوله ی بلندی که قبلا جهت انجام تزریقات در شریان رادیال یا فمورال قرار داده شده ، خارج شده و محل آنژیوگرافی توسط فشار زیاد و یا موادی بسته می شود.

شما را برای اطمینان از عدم خونریزی دقایقی در اتاق ریکاوری نگه میدارند. اگر شرایط شما مساعد باشد به اتاق اصلی خود در خارج از بخش آنژیوگرافی منتقل می شوید. ممکن است توصیه شود برای چندین ساعت از بلند شدن اجتناب کنید تا احتمال خونریزی کاهش یابد.

ممکن است همان روز مرخص شده و بر اساس دستور پزشک برای چندین ساعت چندین روز در بیمارستان بستری شوید.

منبع: برونر قلب و عروق

شماره تلفن بیمارستان: 33295571-73

آدرس لینک آموزش به بیمار بیمارستان:

*آموزش-به-بیمار-و-ارتقای-

سلامت/https://alihos.zaums.ac.ir

داروهایی که قبل از آنژیوگرافی باید قطع شوند:

هپارین از 24 ساعت قبل ، وارفارین از 3 روز قبل و متفورمین از 24 ساعت قبل از انجام پروسیجر باید قطع شود.

موهای زائد ناحیه ی کشاله ی ران یا روی دست را پاک کنید. اگر لنز تماسی، عینک، سنجاق و زیورآلات خود را خارج کنید.

آزمایشات قبل از آنژیوگرافی:

آزمایشاتی قبل از انجام آنژیوگرافی برایتان انجام میشود. شامل: CBC - BS - PT PTT - BUN - CR

برای کل بیماران بخصوص بیماران دیابتی قند خون چک می شود .

در بیماران با مشکلات دریچه ای که چک PT PTT وارفارین مصرف میکنند

خوردن مایعات به دفع ماده ی حجب از بدن شما کمک می کند.

از پرستارتان در مورد مصرف دارو ، حمام کردن ، زمان بازگشت به کار و فعالیت روزانه سوال کنید.

روی محل انجام آنژیوگرافی کیسه ی شن قرار داده می شود که در صورت احساس گرما یا رطوبت در محل اطلاع دهید.

برای چندین روز از فعالیت شدید و برداشتن اجسام سنگین اجتناب کنید.

ممکن است برای مدتی محل سوراخ کردن آنژیوگرافی دردناک باشد و این منطقه دچار خون مردگی ، کبودی و یا اندکی برجسته شود که اهمیت چندانی ندارد.