

درمان هیپوسپادياس چیست ؟

این بیماری با جراحی درمان میشود.

ترمیم الت در موارد شدید هیپوسپادياس به صورت مرحله ای و طی چند عمل انجام می شود.

پس از عمل یک کاتتر که لوله ای نرم و توخالی است داخل الت به منظور حفظ شکل و محل خروج ادرار گذاشته میشود و تا دو هفته در انجا باقی میماند.

بهترین سن عمل بین ۶ تا ۱۲ ماهگی است

هیپوسپادياس چیست ؟

یک نقص جنینی درنوزادهای پسر است که در ان خروجی مجرای ادرار در محلی غیر از نوک الت تناسلی قرار گرفته است خروجی مجرای ادرار در این افراد میتواند در هر محلی در زیر الت تناسلی تا کیسه بیضه قرار گرفته باشد. هیپوسپادياس شدت های مختلفی دارد که به محل خروج ادرار بستگی دارد و هرچه به نوک الت نزدیکتر باشد خفیف تر و هرچه به کیسه بیضه نزدیک تر باشد شدیدتر است.




کد سند : AE/AB/HES/BR-PED/21/01

تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۶/۲۰ شماره بازنگری: ۰

تاریخ بازنگری: ۰ تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۴/۶/۲۰

هیپوسپادياس



ناظر علمی: دکتر محمد عارف امامی

(استاد و متخصص جراحی کودکان و اورولوژی)

دفتر آموزشی سلامت

تابستان ۱۴۰۲

علایم هشدار پس از عمل

- ✚ تب بالای ۳۹ درجه که تا ۲۴ ساعت باقی بماند
- ✚ به سختی ادرار کردن یا ناتوانی در ادرار کردن
- ✚ کبودی و خاکستری شدن نوک الت
- ✚ خونریزی محل عمل
- ✚ عفونت
- ✚ درد علی رغم مصرف مسکن
- ✚ در صورت مشاهده این علایم اورزانشی مراجعه کنید.

عوارض جراحی ترمیمی چیست ؟

- ✚ باز شدن زخم
- ✚ فیستول
- ✚ تنگی مجرای ادرار
- ✚ کوتاه شدن آلت تناسلی
- ✚ انحنای الت

منبع:

پرستاری بیماری های مغز و اعصاب-برونر و سودارث

شماره تلفن بیمارستان: ۰۵۴-۳۳۲۹۵۵۷۱-۳

شماره داخلی: ۱۶۷۳

آدرس لینک آموزش به بیمار بیمارستان:

*آموزش-به-بیمار-و-ارتقای-

سلامت/https://alihos.zaums.ac.ir

مراقبت های پس از عمل

- ✚ ورم و کبودی پس از دو هفته از بین میرود.
- ✚ بسیاری از بیماران پس از حدود ۶ هفته کاملاً بهبود می یابند.
- ✚ الت تناسلی و دیگر قسمت های درگیر را تمیز نگه دارید تا عفونت نکند.
- ✚ دست هایتان را قبل تعویض پانسمان بشوید.
- ✚ پس از عمل جراحی تا چند هفته به خودتان فشارنیاورید تا زخم بهبود یابد.
- ✚ ورزش سنگین و شنا تا ۳ هفته ممنوع است.
- ✚ داروها را مرتب و سر ساعت مصرف کنید.