

آمادگی قبل از نوار مثانه؟

- آنجان آزمایش ادرار چند روز قبل از نوار مثانه تا از عدم وجود عفونت اطمینان حاصل شود
- اگر بیمار سوند مداوم دارد باید از 24 ساعت قبل آنتی بیوتیک مصرف شود
- در افراد دارای یبوست مزمن توصیه می شود قبل از انجام نوار مثانه به کمک دارو دفع مدفوع انجام شده باشد
- اگر بیمار داروهایی شامل اکسی بوتینین، تولترودین، سولیفناسین، تامسولوسین و بتانکول مصرف می کند باید از روز قبل قطع شود
- معمولاً یک ساعت قبل از آنجان تست یک عدد قرص سیپروفلوکساسین و یک عدد دیگر 12 ساعت پس از انجام تست جهت پیشگیری از عفونت ادراری مصرف مشود
- جهت به حداقل رساندن احساس درد می توان از ژل لیدوکائین موضعی استفاده کرد.

نوار مثانه چیست؟

نوار مثانه یا تست یورو دینامیک برای بررسی عملکرد ذخیره ای و تخلیه ای مثانه و مجرا از نظر عصبی و عضلانی استفاده می شود و سیکل این تست 30-45 دقیقه طول می کشد همچنین از آن برای تشخیص بیمارانی استفاده میشود که دارای بی اختیاری ادراری یا سایر مشکلات دستگاه ادراری -تحتانی هستند.

این آمایشات هم برای مردان و هم برای زنان انجام می شود.

از نوار مثانه برای بررسی موارد زیر استفاده می شود:

- عصب و عملکرد عضله
- فشار اطراف و داخل مثانه

میزان جریان ادرار و عوامل دیگر



کد سند :

تاریخ تدوین: شماره بازنگری:

تاریخ بازنگری بعدی: تاریخ بازنگری بعدی:

راهنمای مراجعه کنندگان بخش نوار مثانه

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان




ناظر علمی: دکتر سعید موحد متخصص اورولوژی

سال 1402

عوارض جانبی تست نوار مثانه

- مشاهده خون در ادرار پس از تست
- بوی نامطبوع ادرار به صورت موقت
- احساس سوزش هنگام ادرار
- احساس خارش



مراقبت بعد از تست نوار مثانه

- بیمار بعد از انجام تست نوار مثانه ممکن است هنگام ادرار کردن احساس سوزش داشته باشد، نوشیدن یک لیوان آب هر نیم ساعت تا 2 ساعت به تسکین علائم میکند
- مصرف آنتی بیوتیک به مدت 2 روز از بروز عفونت پیشگیری خواهد کرد
- در صورت بروز علائم عفونت از قبیل تب و لرز و درد به پزشک مراجعه کند .



صفحه آموزش به بیمار

آمادگی برای انجام تست نوار مثانه

- در صورتی که بیمار از ویلچر استفاده می کند یا مشکل تعادل و راه رفتن دارد حتما با یک یا دو همراه به کلینیک مراجعه کند
- در صورتی که بیمار از پوشک، سوند معمولی یا سوند فولی، یا کاندوم شیت و کیسه ادرار استفاده می کند حتما سوند و پوشک جایگزین به همراه داشته باشد
- از بالای زانو تا سر ناف را در هر سمت بدن اصلاح نماید
- اگر بیمار قاعدگی، اسهال یا مشکلات روده ای را تجربه می کند باید زمان دیگری مراجعه نماید
- در صورتی که به داروی خاصی حساسیت دارد حتما به انجام دهنده ی تست اطلاع دهد
- در روز قبل از تست نوار مثانه کافئین مصرف نکند
- روز انجام نوار مثانه بیمار حتما دوش بگیرد