



کد سند : AE/AB/HES/BR-PED/14/01

تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۶/۲۰ شماره بازنگری: ۰۰

تاریخ بازنگری: ۰۰ تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۴/۶/۲۰

کاو از اکی



ناظر علمی: دکتر عقیل میری

متخصص کودکان

دفتر آموزش سلامت

تابستان ۱۴۰۲

تعریف:

این بیماری به علت ناشناخته باعث التهاب عروق شده و ارگان های زیادی را در بدن درگیر می کند. پوست، مخاط، غدد لنفاوی، دیواره رگ ها و قلب در این بیماری درگیر می شوند این بیماری برای اولین بار در سال ۱۹۶۷ در ژاپن گزارش شد و در حال حاضر در ژاپن بیشترین شیوع را دارد. این بیماری بیشتر در بچه های کوچک اتفاق می افتد به طوری که ۸۰ درصد بیماران، کودکان کمتر از ۵ سال هستند. آنچه در این بیماری مهم است بروز در گیری قلبی می باشد.

در صورت عدم درمان مناسب در ۲۵٪ از کودکان گشادی عروق قلب ، اتفاق می افتد.

علائم:

بیماری با تب بالا که به دارو جواب نمی دهد و در صورت عدم درمان تا ۲ هفته طول می کشد، شروع می شود.

کودکان در طول تب بیقرار هستند.

از دیگر علائم اصلی بیماری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- قرمزی و تورم دست و پا

۲- دانه های پوستی

۳- قرمزی دو طرفه غیر چرکی چشم ها

۴- قرمزی مخاط دهان و ترک خوردگی و قرمزی لب ها

۵- بزرگی یک طرفه و بدون درد غدد لنفاوی گردن

در این بیماری پوسته ریزی اطراف مقعد و سپس اطراف ناخن هم دیده می شود.

به محض تشخیص قطعی بیماری علاوه
بر ivig با ید آسپیرین هم تجویز شود و
اکوکاردیوگرافی قلب هم انجام شود.

درمان:

درمان استاندارد تجویز داروی
ایمونوگلوبولین وریدی (ivig) است. با
تجویز این دارو در طی ۲۴ ساعت حال
بیمار رو به بهبود می رود. بهترین زمان
برای تجویز ivig ۱۰ روز اول بیماری
است.

-کنترل دقیق درجه حرارت بدن و در
صورت نیاز استفاده از استامینوفن

-والدین باید بدانند تحریک پذیری مشخصه
ای از سندرم کاوازاکی است و نباید در
مقابل رفتارهای کودک احساس گناه یا
خجالت کنند

شماره تماس بیمارستان: ۰۵۴۳۳۲۹۵۵۷۰ الی ۷۵

شماره داخلی: ۱۷۶۸

منبع: کتاب مراقبت های پرستاری و ونگ

آدرس لینک آموزش به بیمار بیمارستان:

*آموزش-به-بیمار-و-ارتقای-

سلامت/ <https://alihos.zaums.ac.ir>

مراقبت ها:

مراقبت در بیمار بستری بر روی تسکین
علائم، حمایت عاطفی کودک، و کمک در
امر دادن داروها و آموزش به خانواده
و کودک متمرکز می گردد.

-کنترل دقیق وضعیت قلبی کودک

-کنترل جذب و دفع و وزن کودک به
صورت روزانه

-تجویز مایعات به علت دهیدراتاسیون
نسبی

- کنترل مرتب کودک از نظر علائم
نارسایی احتقانی قلب شامل کاهش
ادرار، تنگی نفس

-استفاده از لباس های خنک، لوسیونهای
فاقد بو و البسه نرم و گشاد جهت به حد
اقل رساندن ناراحتی های پوستی.

-توصیه به مصرف مایعات صاف شده و
غذاهای نرم